



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

Mensagens Fundamentais para a Prevenção e Controlo da Transmissão da Gripe Aviária de Animal-para-Animal

Há uma doença nova grave que está a matar as aves domésticas chamada gripe aviária (ou vírus H5N1, ou gripe das aves). É propagada através dos excrementos e fluidos de aves que têm a doença. As aves domésticas e os humanos podem apanhar a doença através de excrementos, mucosidades, sangue ou penas de aves silvestres ou domésticas infectadas. Se for um agricultor ou tiver contacto com aves domésticas ou outras aves no seu cercado ou comunidade, existem muitos modos para proteger os seus animais da gripe aviária. Aqui estão algumas formas:

Participe as aves mortas ou doentes às autoridades.

- Participe casos de morte súbita de aves imediatamente às autoridades.
- Participe casos de doença nas suas aves domésticas imediatamente.

Separe as suas aves de aves silvestres e domésticas que possam ter contacto com aves silvestres.

- Mantenha as suas aves domésticas numa área cercada ou construção fechada, longe de outros animais e aves silvestres.
- Mantenha as suas galinhas separadas de qualquer pato ou outras aves que andem livres.
- Mantenha as suas aves domésticas afastadas de qualquer fonte de água que possa ter sido contaminada por aves silvestres.
- Mantenha as aves domésticas trazidas de fora da sua quinta/herdade separadas das restantes durante pelo menos 14 dias.

Limpe regularmente a área onde as aves domésticas estão guardadas.

- Limpe ou varra diariamente do cercado as fezes e alimentos que não foram consumidos.
- Queime ou enterre penas e outros resíduos longe do cercado. Enterre os resíduos profundamente e com cal viva, para que os necrófagos não os desenterrem.
- Deixe que o estrume se decomponha durante várias semanas para permitir que qualquer vírus morra antes de utilizar o estrume como fertilizante.
- Limpe o equipamento pequeno da quinta diariamente.

Não traga a contaminação de outras quintas ou mercados.

- Se não vender as suas aves domésticas no mercado, mantenha as aves separadas das restantes durante pelo menos 14 dias antes de as juntar ao resto do bando.
- Certifique-se de que escova ou lava os seus sapatos e as rodas da bicicleta/mota e que muda de roupa depois de voltar de quintas ou de mercados de aves vivas, de modo a não levar para casa vírus na sua roupa, sapatos, ou equipamento.
- Limpe ou desinfecte tudo o que entrar na quinta que possa ter tido contacto com aves domésticas ou seus excrementos fora da fazenda. Isto inclui roupa, ferramentas e equipamento, como gaiolas e pneus de bicicleta e de automóvel.
- Não peça emprestado equipamento ou veículos de outras quintas.
- Não transporte galinhas vivas ou mortas, patos ou outras aves de um lugar para outro, mesmo pensando que as suas aves são saudáveis.
- A manipulação de aves domésticas em áreas afectadas pela gripe das aves deve ser levada a cabo dentro da área e não transportando as aves para outras áreas.
- Não traga outros animais, tais como pintos, patos ou leitões, de outra quinta.

Se encontrar aves mortas ou doentes contacte as autoridades da sua área imediatamente.

- As aves mortas devem ser colocadas num saco ou outro recipiente, longe de outros animais até que as autoridades possam inspeccionar a situação.
- Se vir uma ou mais aves doentes, não as deixe no cercado. Retire-as do bando, usando luvas e coloque-as numa gaiola fechada. Seguidamente contacte o veterinário ou conselheiro agrícola (ou outras autoridades) imediatamente.
- As aves mortas não devem ser lançadas num rio, lagoa ou outra massa de água.

Se estiver envolvido em operações de abate selectivo recolha, pratique-o de forma segura e humana.

- Processe cada lote de aves separadamente e limpe e desinfecte as capoeiras entre cada bando novo.
- Limpe e desinfecte minuciosamente o equipamento e veículos (incluindo pneus e chassis) que entrarem ou saírem da quinta.
- Pratique a boa bio-segurança use equipamento protector pessoal e desinfectante.